

PAINAD

Scala di Valutazione del Dolore nella Demenza Avanzata

PAINAD scale : Warden V, Hurley AC, Volicer L. 2003

COGNOME dell'assistito CF		NOME DATA DI NASCITA			
	INDICATORE	0	1	2	Punteggio
1	Respiro indipendente dalla vocalizzazione	Normale	Respirazione a volte difficoltosa. Brevi periodi di iperventilazione	Respirazione difficoltosa, rumorosa. Lunghi periodi di iperventilazione. Respirazione Cheyne-Stokes	
2	Vocalizzazione (del dolore)	Assente	Lamenti o gemiti occasionali Espressione vocale di basso livello (mormorii o borbottii) con un significato negativo o disapprovatorio	Frase ripetute in modo agitato usate come modo per richiamare l'attenzione (perseverazioni). Lamenti o gemiti ben distinguibili (ad alto volume). Pianto.	
3	Espressione facciale	Sorridente o inespressiva	Triste. Spaventata. Accigliata.	Smorfie di dolore	
4	Linguaggio del corpo	Rilassato	Teso. Movimenti nervosi. Irrequietezza.	Rigida. Pugni chiusi. Ginocchia flesse. Tira o spinge via. Atteggiamento violento.	
5	Necessità di consolazione	Nessun bisogno di essere consolato	Distratto o rassicurato dalla voce o dal contatto.	Paziente inconsolabile, impossibile da distrarre o rassicurare	
Totale					

Data di compilazione		Ora di compilazione		Operatore compilatore	
----------------------	--	---------------------	--	-----------------------	--

Punteggio 0 - 1 = dolore assente

Punteggio 2 - 3 = dolore lieve

Punteggio 4 - 5 = dolore moderato

Punteggio 6 - 7 = dolore forte

Punteggio 8 - 9 = dolore molto forte

Punteggio 10 = dolore insopportabile